

MATÉMATICAS

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias



Variable Compleja I

Examen 1

Por: Lorenzo Antonio Alvarado Cabrera

Problema 1. – Sean $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ tales que cumplen $\frac{z_2 - z_1}{z_3 - z_1} = \frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3}$. Demuestras que estos tres puntos determinan un triángulo equilátero.

Demostración: Primero veamos que 3 complejos que cumplan esta igualdad son distintos entre sí y no son colineales.

1) Son distintos entre sí. Como se cumplen la igualdad tendremos que $z_3 - z_1 \neq 0$ y $z_2 - z_3 \neq 0$
 $\Leftrightarrow z_3 \neq z_1$ y $z_2 \neq z_3$. Ahora, si suponemos que $z_2 = z_1$ tendremos que

$$\frac{z_2 - z_1}{z_3 - z_1} = \frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3} \Leftrightarrow \frac{z_2 - z_2}{z_3 - z_2} = \frac{z_2 - z_3}{z_2 - z_3} \Rightarrow 0 = 1!!!$$

por lo que $z_2 \neq z_1 \therefore$ todos son distintos entre sí.

2) No son colineales. Supongamos que $z_3 = rz_1$ y $z_2 = sz_1$ con $r, s \in \mathbb{R} - \{1\}$ (pues ya vimos que no son iguales), entonces por hipótesis

$$\begin{aligned} \frac{z_2 - z_1}{z_3 - z_1} = \frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3} &\Leftrightarrow \frac{sz_1 - z_1}{rz_1 - z_1} = \frac{z_1 - rz_1}{sz_1 - rz_1} \Leftrightarrow \frac{z_1(s-1)}{z_1(r-1)} = \frac{z_1(1-r)}{z_1(s-r)} \\ &\Leftrightarrow \frac{s-1}{r-1} = \frac{1-r}{s-r} \Leftrightarrow (s-1)(s-r) = -(r-1)^2 \end{aligned}$$

como $r \neq 1$ tendremos que $-(r-1)^2 < 0$ por lo que $(s-1)(s-r) < 0$ y tendremos dos casos:

- Sí $s-1 < 0$ y $s-r > 0 \Rightarrow s < 1$ y $s > r \Rightarrow r < s < 1 \Rightarrow r-1 < s-1 < 0$ y entonces $\frac{s-1}{r-1} > 0$, además teniendo que $0 < s-r < 1-r \Rightarrow \frac{1-r}{s-r} > 0$!!! y aquí llegamos a un absurdo, pues como $\frac{s-1}{r-1} = \frac{1-r}{s-r}$ estaríamos diciendo que un negativo es igual a un positivo.

- Sí $s-1 > 0$ y $s-r < 0$ siguiendo un procedimiento similar llegamos a lo mismo.

∴ no son colineales.

3) Veamos que efectivamente forman un triángulo equilátero.

Obs. – Notemos que $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ cumplen la ecuación si y solo si $0, z_2 - z_1, z_3 - z_1 \in \mathbb{C}$ la cumplen. En efecto, si $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ cumplen la ecuación entonces

$$\frac{z_2 - z_1}{z_3 - z_1} = \frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3} \Leftrightarrow \frac{(z_2 - z_1) - 0}{(z_3 - z_1) - 0} = \frac{0 - (z_1 - z_3)}{0 - (z_2 - z_3)}$$

por lo que $0, z_2 - z_1, z_3 - z_1 \in \mathbb{C}$ cumplen la ecuación.

Esto me dice que es lo mismo trabajar con los complejos dados a trabajar con los complejos desplazados al origen, con ello vasta probar que dados $z, w \in \mathbb{C}$ tales que cumplen $\frac{z}{w} = \frac{-w}{z-w}$, estos forman un triángulo equilátero con el origen.

En efecto, como $\frac{z}{w} = \frac{-w}{z-w}$:

$$\begin{aligned} \Rightarrow z(z-w) = -w^2 &\Rightarrow z^2 - zw + w^2 = 0 \Rightarrow z = \frac{w \pm \sqrt{w^2 - 4(1)(w^2)}}{2} \\ &= \frac{w \pm \sqrt{-3w^2}}{2} = \frac{w \pm i\sqrt{3}w}{2} = \left(\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)w \end{aligned}$$

Así, tendremos que $|z - 0| = |z| = \left| \left(\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2} \right)w \right| = \left| \frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2} \right| |w| = 1 \cdot |w| = |w| = |w - 0|$, entonces la distancia de z a 0 es la misma que de w a 0, y por último la distancia de z a w es: $|z - w| = \left| \left(\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2} \right)w - w \right| = \left| \left(-\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2} \right)w \right| = \left| -\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2} \right| |w| = 1 \cdot |w| = |w| = |z|$ ∴ todos los lados son iguales, por

Esto es pues dado $w = re^{i\theta}$ y $-3 = 3e^{i\pi} \Rightarrow -3w^2 = 3r^2 e^{(\pi+2\theta)i}$ por lo que $\sqrt{-3w^2} = \sqrt{3r^2 e^{(\pi+2\theta)i}} = \sqrt{3} \cdot r \cdot e^{(\pi/2+2\theta)i + \pi k i}$ con $k = 0, 1$ ∴ $\sqrt{-3w^2} = \sqrt{3} \cdot r e^{0i} e^{\pi/2i} e^{\pi k i} = \pm i\sqrt{3}w$.

lo que forman un triángulo equilátero con el origen \therefore si $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$ son tales que cumplen

$\frac{z_2 - z_1}{z_3 - z_1} = \frac{z_1 - z_3}{z_2 - z_3}$. Estos tres puntos determinan un triángulo equilátero. ■


Problema 2. – Calcule las raíces cubicas de $\overline{(-4\sqrt{3} + 4i)}$.

Demostración: Primero simplificaremos la expresión.

Tenemos que $z = \overline{(-4\sqrt{3} + 4i)} = -(-4\sqrt{3} - 4i) = 4\sqrt{3} + 4i = 8(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i)$, entonces expresando esto en forma polar tenemos que $z = 8e^{\pi/6i}$ de esta manera tendremos que las raíces cubicas son:

$$z_k = \sqrt[3]{8} \exp\left(\frac{\pi}{6}i + \frac{2\pi ik}{3}\right) = 2 \exp\left(\frac{\pi}{18}i + \frac{2\pi ik}{3}\right) \text{ con } k = 0, 1, 2$$

$$\begin{aligned} z_0 &= 2 \exp\left(\frac{\pi}{18}i\right) \\ \Rightarrow z_1 &= 2 \exp\left(\frac{\pi}{18}i + \frac{2\pi i}{3}\right) = 2 \exp\left(\frac{13\pi}{18}i\right) \\ z_2 &= 2 \exp\left(\frac{\pi}{18}i + \frac{4\pi i}{3}\right) = 2 \exp\left(\frac{25\pi}{18}i\right) \end{aligned}$$



Problema 3. – Sean $z_1, \dots, z_n \in \mathbb{C}$. Demuestre que $|z_1 + \dots + z_n| = |z_1| + \dots + |z_n|$ si y solo si $\arg(z_j) = \arg(z_i)$ para cualesquiera $j \neq i \in \{1, \dots, n\}$.

Demostración:

≤] Supongamos que $\arg(z_j) = \arg(z_i)$ para cualesquiera $j \neq i \in \{1, \dots, n\}$. Entonces como tienen el mismo ángulo, serán colineales sobre el mismo rayo, es decir, existen $r_i \geq 0$ tales que $z_i = r_i z_1$ $\forall i \geq 2$, con lo que

$$\begin{aligned} |z_1 + z_2 + \dots + z_n| &= |z_1 + z_2 + \dots + r_n z_1| = |z_1(1 + r_2 + \dots + r_n)| = |z_1| |1 + r_2 + \dots + r_n| \\ &= |z_1| (1 + r_2 + \dots + r_n) = |z_1| + r_2 |z_1| + \dots + r_n |z_1| = |z_1| + |r_2 z_1| + \dots + |r_n z_1| \\ &= |z_1| + |z_2| + \dots + |z_n| \end{aligned}$$

Ψ Esto pues $|z| = \left|8\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right)\right| = 8\left|\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right| = 8 \cdot 1 = 8$ y $\arg(z) = \arctan\left(\frac{8 \cdot 1/2}{8 \cdot \sqrt{3}/2}\right) = \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{6}$, esto pues el numero complejo está en el primer cuadrante.

⇒] Por inducción sobre n .

• Lo probaremos para $n = 2$. Por la desigualdad del triángulo sabemos qué $|z + w| \leq |z| + |w| \quad \forall z, w \in \mathbb{C}$ y que la igualdad se cumple si y solo si $|z\bar{w}| = \operatorname{Re}(z\bar{w})$ (esto se obtiene de la propia demostración), entonces tenemos que la parte real de un numero complejo es exactamente su modulo, esto es posible si y solo si es un número real, por lo que $z\bar{w} \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \operatorname{arg}(z\bar{w}) = 0 \Leftrightarrow \operatorname{arg}(z) + \operatorname{arg}(\bar{w}) = 0 \Leftrightarrow \operatorname{arg}(z) - \operatorname{arg}(w) = 0 \Leftrightarrow \operatorname{arg}(z) = \operatorname{arg}(w)$.

Entonces si se tiene que $|z_1 + z_2| = |z_1| + |z_2|$ esto es si y solo sí $\operatorname{arg}(z_1) = \operatorname{arg}(z_2)$.

• Ahora supongamos que se cumple para alguna $k > 2$, es decir, supongamos que si $|z_1 + \dots + z_k| = |z_1| + \dots + |z_k|$ entonces $\operatorname{arg}(z_j) = \operatorname{arg}(z_i)$ para cualesquiera $j \neq i$, y probaremos que se cumple para $k + 1$.

En efecto, supongamos que $|z_1 + \dots + z_k + z_{k+1}| = |z_1| + \dots + |z_k| + |z_{k+1}|$. Llamemos $w = z_1 + \dots + z_k$ y $z = z_{k+1}$, entonces tendremos que $|w| \leq |z_1| + \dots + |z_k|$, así por hipótesis

$$\begin{aligned} |w + z_{k+1}| &= |z_1| + \dots + |z_k| + |z_{k+1}| \geq |w| + |z_{k+1}| \\ \Rightarrow |w + z_{k+1}| &\geq |w| + |z_{k+1}| \end{aligned}$$

Pero en esta última no puede pasar que $|w + z_{k+1}| > |w| + |z_{k+1}|$ pues contradice a la desigualdad del triángulo $\Rightarrow |w + z_{k+1}| = |w| + |z_{k+1}|$, así:

$$\begin{aligned} |z_1 + \dots + z_k| + |z_{k+1}| &= |z_1 + \dots + z_k + z_{k+1}| \underset{\text{hip}}{=} |z_1| + \dots + |z_k| + |z_{k+1}| \\ \Rightarrow |z_1 + \dots + z_k| &= |z_1| + \dots + |z_k| \end{aligned}$$

Y por hipótesis de inducción se tendrá que $\operatorname{arg}(z_j) = \operatorname{arg}(z_i) \quad \forall i \neq j \neq k + 1$. Con esto tenemos que los argumentos de los z_j son todos iguales con $j \neq k + 1$.

PD $\operatorname{arg}(z_{k+1}) = \operatorname{arg}(z_1)$

Por lo anterior sabemos qué $|w + z_{k+1}| = |w| + |z_{k+1}|$ y por la base de inducción esto es cierto si y solo si $\operatorname{arg}(w) = \operatorname{arg}(z_{k+1})$, pero como todos los z_j son colineales con $j \neq k + 1$ se tendrá que $\operatorname{arg}(w) = \operatorname{arg}(z_1) \therefore \operatorname{arg}(z_{k+1}) = \operatorname{arg}(z_1)$

∴ $\operatorname{arg}(z_j) = \operatorname{arg}(z_i) \quad \forall i \neq j \in \{1, \dots, k + 1\}$. Quedando demostrado. ■

↳ Si sucede que $\operatorname{Re}(z) = |z| \Rightarrow \operatorname{Re}^2(z) = \operatorname{Re}^2(z) + \operatorname{Im}^2(z) \Rightarrow \operatorname{Im}(z) = 0$, la otra implicación es trivial.

Problema 4. — Pruebe que la función $z \rightarrow 1/z$ actúa en la esfera de Riemann \mathbb{S}^2 como una rotación de π radianes alrededor del eje x. Concluya que $z \rightarrow 1/z$ preserva la familia de círculos y rectas de \mathbb{C} .

Demostración:

1) Sea $z \in \mathbb{C}$.



- Si $z = 0$, tendremos que $\pi(z) = (0, 0, -1)$, además tendremos que $\frac{1}{z} = \infty$ y entonces $\pi(\infty) = (0, 0, 1)$ con lo que efectivamente, tenemos una rotación de π radianes sobre el eje x.
- Si $z \neq 0$. Entonces sabemos que su proyección sobre la esfera de Riemann es

$$\pi(z) = \frac{1}{|z|^2 + 1} (2 \operatorname{Re}(z), 2 \operatorname{Im}(z), |z|^2 - 1)$$

así tendremos que la proyección sobre la esfera de Riemann de $1/z$ es

$$\begin{aligned} \pi\left(\frac{1}{z}\right) &= \frac{1}{|1/z|^2 + 1} (2 \operatorname{Re}\left(\frac{1}{z}\right), 2 \operatorname{Im}\left(\frac{1}{z}\right), \left|\frac{1}{z}\right|^2 - 1) = \frac{1}{1/|z|^2 + 1} \left(\frac{2}{|z|^2} \operatorname{Re}(z), -\frac{2}{|z|^2} \operatorname{Im}(z), \frac{1}{|z|^2} - 1 \right) \text{ (1)} \\ &= \frac{|z|^2}{|z|^2 + 1} \left(\frac{2}{|z|^2} \operatorname{Re}(z), -\frac{2}{|z|^2} \operatorname{Im}(z), \frac{1-|z|^2}{|z|^2} \right) = \frac{1}{|z|^2 + 1} (2 \operatorname{Re}(z), -2 \operatorname{Im}(z), -[|z|^2 - 1]) \end{aligned}$$

Entonces si denotamos $\pi(z) = (a, b, c)$ tendremos que $\pi\left(\frac{1}{z}\right) = (a, -b, -c)$, con lo cual tenemos una reflexión sobre el eje x y el eje z, que se traduce en una rotación en un ángulo de π radianes sobre la esfera de Riemann, pues si tomamos el plano $P = \{(a, x, y) : x, y \in \mathbb{R}\}$ se tendrá que el ángulo de rotación del punto (a, b, c) al punto $(a, -b, -c)$ es π radianes



2) Ahora veamos que preserva círculos y rectas de \mathbb{C} .

Tenemos que la ecuación general de una recta/circunferencia viene dada por

Ω Tenemos que $\operatorname{Re}\left(\frac{1}{z}\right) = \operatorname{Re}\left(\frac{\bar{z}}{|z|^2}\right) = \frac{1}{|z|^2} \operatorname{Re}(\bar{z}) = \frac{1}{|z|^2} \operatorname{Re}(z) = \frac{1}{|z|^2} \operatorname{Re}(z)$ y $\operatorname{Im}\left(\frac{1}{z}\right) = \operatorname{Im}\left(\frac{\bar{z}}{|z|^2}\right) = \frac{1}{|z|^2} \operatorname{Im}(\bar{z}) = -\frac{1}{|z|^2} \operatorname{Im}(z)$

$$C : A z \bar{z} + \bar{E} z + E \bar{z} + D = 0^{\textcolor{red}{\alpha}}, \quad A, D \in \mathbb{R} \quad \wedge \quad E \in \mathbb{C}$$

Siendo una circunferencia si $A \neq 0$ y a una recta sí $A = 0$. Además, notemos que

$$A 0 \bar{0} + \bar{E} 0 + E \bar{0} + D = 0 \Leftrightarrow D = 0$$

lo que nos dice que $0 \in C \Leftrightarrow D = 0$.

Con esto mencionado tendremos dos casos:

- Si $0 \notin C$. (Entonces $D \neq 0$)

Demostraremos que si $z \in C$ entonces $\frac{1}{z}$ está en:

$$\tilde{C} : D w \bar{w} + E w + \bar{E} \bar{w} + A = 0^{\textcolor{teal}{\pi}}$$

En efecto, tenemos que

$$\begin{aligned} D \frac{1}{z} \overline{\left(\frac{1}{z}\right)} + E \frac{1}{z} + \bar{E} \overline{\left(\frac{1}{z}\right)} + A &= D \frac{1}{z} \frac{1}{\bar{z}} + E \frac{1}{z} + \bar{E} \frac{1}{\bar{z}} + A = D \frac{1}{z} \frac{1}{\bar{z}} + E \frac{\bar{z}}{|z|^2} + \bar{E} \frac{z}{|z|^2} + A \\ &= \frac{1}{z} \frac{1}{\bar{z}} [D + E \frac{\bar{z} \cdot (z\bar{z})}{|z|^2} + \bar{E} \frac{z \cdot (z\bar{z})}{|z|^2} + A z \bar{z}] = \frac{1}{z} \frac{1}{\bar{z}} [D + E \bar{z} + \bar{E} z + A z \bar{z}]_{z \in C} = \frac{1}{z} \frac{1}{\bar{z}} [0] = 0 \end{aligned}$$

$\therefore \frac{1}{z} \in \tilde{C}$ por lo que la recta/circunferencia C va a dar a la circunferencia \tilde{C} bajo la función $z \rightarrow 1/z$. (Esto pues si $A=0$ se seguirá teniendo que \tilde{C} es circunferencia)

- Si $0 \in C$. (Entonces $D = 0$)

Demostraremos que si $z \in C : A z \bar{z} + \bar{E} z + E \bar{z} = 0$ entonces $\frac{1}{z}, z \neq 0$ está en:

$$\tilde{C} : E w + \bar{E} \bar{w} + A = 0^{\textcolor{blue}{\Theta}}$$

En efecto, tenemos que

$$\begin{aligned} E \frac{1}{z} + \bar{E} \overline{\left(\frac{1}{z}\right)} + A &= E \frac{1}{z} + \bar{E} \frac{1}{\bar{z}} + A = E \frac{\bar{z}}{|z|^2} + \bar{E} \frac{z}{|z|^2} + A \\ &= \frac{1}{z} \frac{1}{\bar{z}} [E \frac{\bar{z} \cdot (z\bar{z})}{|z|^2} + \bar{E} \frac{z \cdot (z\bar{z})}{|z|^2} + A z \bar{z}] = \frac{1}{z} \frac{1}{\bar{z}} [E \bar{z} + \bar{E} z + A z \bar{z}]_{z \in C} = \frac{1}{z} \frac{1}{\bar{z}} [0] = 0 \end{aligned}$$

^{\textcolor{red}{\alpha}} Esto se justifica al final del documento (anexo 1).

^{\textcolor{teal}{\pi}} (anexo 2)

^{\textcolor{blue}{\Theta}} (anexo 3)

$\therefore \frac{1}{z} \in \tilde{C}$ para $z \neq 0$, y como $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{z} = \infty$ se tiene que cuando z crece el punto en la recta se va al infinito, \therefore por lo que la recta/circunferencia C va a dar a la recta \tilde{C} bajo la función $z \rightarrow 1/z$. (Esto pues si $A=0$ seguiremos teniendo que \tilde{C} es recta)

\therefore la función $z \rightarrow \frac{1}{z}$ preserva las rectas y circunferencias de \mathbb{C} . ■

Problema 5. – *Pruebe que las trasformaciones de Möbius son composición de algunas de las siguientes funciones: rotaciones, homotecias, traslaciones y $z \rightarrow \frac{1}{z}$. Concluya mostrando que las transformaciones de Möbius preservan a la familia de círculos y rectas.*

Demostración: Sean $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ tales que $ad - bc \neq 0$ y sea la transformación de Möbius $T : \hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$ dada por:

$$T(z) = \begin{cases} a/c & \text{si } z = \infty \\ \infty & \text{si } z = -d/c \\ \frac{az+b}{cz+d} & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Primero recordemos que para el plano complejo extendido tenemos que $w + \infty = \infty$, $w \cdot \infty = \infty$, $\frac{z}{\infty} = 0$ y $\frac{z}{0} = \infty$.

1) Tendremos dos casos:

- Si $c = 0$ entonces $d \neq 0$ pues si pasara que $d = 0 \Rightarrow ad = 0 = bc$!! cosa que por hipótesis no

pasa. Con esto la transformación de Möbius será $T(z) = \begin{cases} \infty & \text{si } z = \infty \\ \frac{a}{d}z + \frac{b}{d} & \text{e.o.c} \end{cases}$

Entonces sean $T_1(z) = \frac{a}{d}z$ y $T_2(z) = z + \frac{b}{d}$ **PD $T = T_2 \circ T_1$** .

Tenemos que estas trasformaciones son funciones de $\hat{\mathbb{C}}$ a $\hat{\mathbb{C}}$, por lo que su composición va de $\hat{\mathbb{C}}$ a $\hat{\mathbb{C}}$, entonces solo vasta probar que $T_2 \circ T_1$ y T tienen la misma regla de correspondencia, es decir, $T(z) = (T_2 \circ T_1)(z) \forall z \in \hat{\mathbb{C}}$.

En efecto, sea $z \in \hat{\mathbb{C}}$.

○ Si $z = \infty \Rightarrow T_1(\infty) = \frac{a}{d}\infty = \infty \Rightarrow (T_2 \circ T_1)(\infty) = \infty + \frac{b}{d} = \infty = T(\infty) \Rightarrow \therefore (T_2 \circ T_1)(\infty) = T(\infty)$.

○ Si $z \neq \infty \Rightarrow T_1(z) = \frac{a}{d}z \Rightarrow (T_2 \circ T_1)(z) = \frac{a}{d}z + \frac{b}{d} = T(z) \Rightarrow \therefore (T_2 \circ T_1)(z) = T(z)$.

$\therefore \forall z \in \hat{\mathbb{C}} \ (T_2 \circ T_1)(z) = T(z) \therefore$ son iguales. Así la transformación de Möbius es composición de una traslación ($T_2(z)$) con una homotecia ($T_1(z)$).

- Si $c \neq 0$, sean $T_1(z) = z + \frac{d}{c}$, $T_2(z) = \frac{1}{z}$, $T_3(z) = \frac{bc - ad}{c^2}z$, $T_4(z) = z + \frac{a}{c}$

$$\text{PD } T = T_4 \circ T_3 \circ T_2 \circ T_1.$$

Tenemos que cada una de estas trasformaciones son funciones de $\hat{\mathbb{C}}$ a $\hat{\mathbb{C}}$, por lo que su composición va de $\hat{\mathbb{C}}$ a $\hat{\mathbb{C}}$, entonces solo valla probar que $T_4 \circ T_3 \circ T_2 \circ T_1$ y T tienen la misma regla de correspondencia, es decir, $T(z) = (T_4 \circ T_3 \circ T_2 \circ T_1)(z) \forall z \in \hat{\mathbb{C}}$.

En efecto, sea $z \in \hat{\mathbb{C}}$.

$$\textcircled{O} \text{ Si } z = \infty \Rightarrow T_1(\infty) = \infty + \frac{d}{c} = \infty \Rightarrow (T_2 \circ T_1)(\infty) = \frac{1}{\infty} = 0 \Rightarrow (T_3 \circ T_2 \circ T_1)(\infty) = \frac{bc - ad}{c^2} \cdot 0 = 0$$

$$\Rightarrow (T_4 \circ T_3 \circ T_2 \circ T_1)(\infty) = 0 + \frac{a}{c} = \frac{a}{c} = T(\infty) \therefore (T_4 \circ T_3 \circ T_2 \circ T_1)(\infty) = T(\infty).$$

$$\textcircled{O} \text{ Si } z = -\frac{d}{c} \Rightarrow T_1\left(-\frac{d}{c}\right) = -\frac{d}{c} + \frac{d}{c} = 0 \Rightarrow (T_2 \circ T_1)\left(\frac{d}{c}\right) = \frac{1}{0} = \infty \Rightarrow (T_3 \circ T_2 \circ T_1)\left(\frac{d}{c}\right) = \frac{bc - ad}{c^2} \cdot \infty$$

$$= \infty \Rightarrow (T_4 \circ T_3 \circ T_2 \circ T_1)\left(\frac{d}{c}\right) = \infty + \frac{a}{c} = \infty = T\left(-\frac{d}{c}\right) \therefore (T_4 \circ T_3 \circ T_2 \circ T_1)\left(-\frac{d}{c}\right) = T\left(-\frac{d}{c}\right).$$

$$\textcircled{O} \text{ Si } z \neq -\frac{d}{c}, \infty. \text{ Entonces } T_1(z) = z + \frac{d}{c} \Rightarrow (T_2 \circ T_1)(z) = \frac{1}{z + \frac{d}{c}} = \frac{c}{cz + d} \Rightarrow (T_3 \circ T_2 \circ T_1)\left(\frac{a}{c}\right) =$$

$$\frac{bc - ad}{c^2} \cdot \frac{c}{cz + d} = \frac{bc - ad}{c^2 z + cd} \Rightarrow (T_4 \circ T_3 \circ T_2 \circ T_1)(z) = \frac{bc - ad}{c^2 z + cd} + \frac{a}{c} = \frac{c[bc - ad] + a[c^2 z + cd]}{c[c^2 z + cd]}$$

$$= \frac{c[bc - ad] + ca[cz + d]}{c[c^2 z + cd]} = \frac{[bc - ad] + a[cz + d]}{[c^2 z + cd]} = \frac{bc - ad + acz + ad}{c^2 z + cd} = \frac{bc + acz}{c^2 z + cd} = \frac{b + az}{cz + d} = T(z)$$

$$\therefore (T_4 \circ T_3 \circ T_2 \circ T_1)(z) = T(z)$$

$\therefore \forall z \in \hat{\mathbb{C}} \ (T_4 \circ T_3 \circ T_2 \circ T_1)(z) = T(z) \therefore$ son iguales. Así la transformación de Möbius es composición de traslaciones u rotaciones ($T_1(z)$, $T_4(z)$), homotecias ($T_3(z)$) y la inversión (

$$T_2(z) = \frac{1}{z}). \blacksquare$$

2) Ahora veamos que preserva rectas y circunferencias.

Vasta demostrar que las traslaciones, homotecias e inversiones preservan las rectas y circunferencias.

- $L(z) = z + w$ con $w \in \mathbb{C}$.

Esto es claro, ya que al trasladar todos los puntos de una circunferencia o una recta esta sigue siendo una circunferencia u una recta. Veámoslo en \mathbb{R}^2 , con $z = a + ib \wedge w = c + id$.

Supongamos que $z := (a, b)$ están sobre la circunferencia $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$, entonces tendremos que el punto $z + w := (a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$ está sobre la circunferencia $(x - h - c)^2 + (y - k - d)^2 = r^2$, en efecto, pues $(a + c - h - c)^2 + (b + d - k - d)^2 = (a - h)^2 + (b - k)^2 = r^2$. Por lo que la traslación preserva a la circunferencia.

Igualmente, Supongamos que $z := (a, b)$ están sobre la recta $y = mx + e$, entonces tendremos que el punto $z + w := (a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$ está sobre la recta $y = mx + d + e - mc$, en efecto, pues $m[a + c] + d + e - mc = ma + mc + d + e - mc = ma + e + d = b + d$. Por lo que la traslación preserva a la recta.

- $L(z) = w \cdot z$ con $w \in \mathbb{C}$.

Si $w = 0$, no se cumple, pues todo converge al 0, entonces supongamos $w \neq 0$ y sea $C : Az\bar{z} + \bar{E}z + E\bar{z} + D = 0$ una recta/circunferencia, entonces si $z \in C$ tendremos que $w \cdot z$

pertenece a la recta/circunferencia $\tilde{C} : \frac{A}{|w|^2}z\bar{z} + \frac{\bar{E}}{w}z + \frac{E}{\bar{w}}\bar{z} + D = 0$ ^π.

En efecto, $\frac{A}{|w|^2}(w \cdot z)(\overline{w \cdot z}) + \frac{\bar{E}}{w}w \cdot z + \frac{E}{\bar{w}}\overline{w \cdot z} + D = \frac{A}{|w|^2}|w|^2z\bar{z} + \bar{E}z + E\bar{z} + D = Az\bar{z} + \bar{E}z + E\bar{z} + D$

$= 0$, por lo que la transformación preserva a las rectas y círculos.

- $L(z) = \frac{1}{z}$

En el problema 4 demostramos que las preserva.

Con esto finalmente podemos concluir:

- Si $c = 0$ tenemos que $T(z) = \frac{a}{d}z + \frac{b}{d}$ es una composición de una traslación y una homotecia ^μ.

Entonces si C es una recta/circunferencia se tendrá que $T_1(C)$ es recta/circunferencia por lo que $T_2(T_1(C)) = T(C)$ recta/circunferencia. ∴ T preserva las rectas y circunferencias.

- Si $c \neq 0$. Sea C una recta/circunferencia. Tendremos dos subcasos:

- ⊗ Si $-\frac{d}{c} \in C$, entonces tendremos que $T_1(C)$ es una recta/circunferencia y es tal que $T_1(-\frac{c}{d}) = 0 \in T_1(C)$, entonces por el problema 4 se tendrá que $T_2(T_1(C))$ es una recta. Entonces como $T_3(z) = \frac{bc - ad}{c^2}z$ es homotecia ^χ ⇒ $T_3(T_2(T_1(C)))$ es recta. Finalmente, como

^π (anexo 3)

^μ Es no trivial pues se tiene que $a/d \neq 0$, pues si $a = 0 \Rightarrow ad = 0 = bc$ cosa que no puede pasar.

^χ Pues $c \neq 0$.

$T_4(z) = z + \frac{a}{c}$ es traslación $\Rightarrow T_4(T_3(T_2(T_1(C))))$ es recta.

⊗ Si $-\frac{d}{c} \notin C$. Como $T_1(z) = z + \frac{d}{c}$ es traslación $\Rightarrow T_1(C)$ es recta/círculo. Como $T_2(z) = \frac{1}{z}$ es inversión $\Rightarrow T_2(T_1(C))$ es recta/círculo. ^β Como $T_3(z) = \frac{bc-ad}{c^2}z$ es homotecia ^χ $\Rightarrow T_3(T_2(T_1(C)))$ es recta/círculo. Finalmente, como $T_4(z) = z + \frac{a}{c}$ es traslación $\Rightarrow T_4(T_3(T_2(T_1(C))))$ es recta/círculo.

∴ la transformación de Möbius preserva rectas y circunferencias ■


Problema 6. – Sea $B = \left\{ z \in \mathbb{C} : 1 < |z| < e^2 \wedge -\frac{\pi}{2} < \arg(z) < \frac{\pi}{2} \right\}$. Describa a las imágenes de B bajo todas las ramas del logaritmo. Después interprete geométricamente la conformalidad de las ramas del logaritmo en su dominio de analiticidad, usando círculos concéntricos al origen y semirectas por el origen.

Solución: Sea \log la rama del logaritmo con argumentos en $[y_0, y_0 + 2\pi]$.

1) Con lo que sí $z \in B$, tendremos que $\log(z) = \ln|z| + i(\theta + 2k_0\pi)$ con k_0 tal que $\theta + 2k_0\pi \in [y_0, y_0 + 2\pi]$.

Dado que $z \in B \Rightarrow 1 < |z| < e^2 \wedge -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \Rightarrow \ln(1) < \ln|z| < \ln e^2 \wedge -\frac{\pi}{2} + 2k_0\pi < \theta + 2k_0\pi < \frac{\pi}{2} + 2k_0\pi \Rightarrow 0 < \ln|z| < 2 \wedge -\frac{\pi}{2} + 2k_0\pi < \theta + 2k_0\pi < \frac{\pi}{2} + 2k_0\pi$

∴ $\log(B) = \left\{ w \in \mathbb{C} : 0 < \operatorname{Re}(w) < 2, -\frac{\pi}{2} + 2k_0\pi < \arg(w) < \frac{\pi}{2} + 2k_0\pi \right\}$



^β Como $-\frac{d}{c} \notin C$ tendremos que $T_1(z) \neq 0$ y entonces $T_2(T_1(z)) \neq \infty$

^χ Notemos que por hipótesis del problema $bc-ad \neq 0$ y como $c \neq 0$ y $c \neq \infty$ tendremos que $\frac{bc-ad}{c^2} \neq 0$

2) Ahora, sabemos que \log es analítica en $\mathbb{C} \setminus B_{y_0}$ y que además $\log(z) = 0 \Leftrightarrow z = 1$. Por lo que por un teorema visto en clase tendremos que \log es conforme en $\mathbb{C} \setminus (B_{y_0} \cup \{1\})$.

Para comprobarlo geométricamente veamos que se cumple con circunferencias centradas en el origen y semi-rectas por el origen.



Consideremos la circunferencia centrada en el origen $D_r = \{re^{i\alpha} : \alpha \in [0, 2\pi)\}$, $r > 0$ y la semi-recta $L_\theta = \{te^{i\theta} : \theta \in [0, 2\pi), t \geq 0\}$ donde $\theta \neq y_0$ (pues \log no es analítica ahí). Además, descartamos el caso en que $r = 1$ y $\theta = 0$, pues en este caso se tendrá la circunferencia unitaria y la recta de los reales positivos, que se intersecan en 1 donde la función no es conforme.

Por último, notemos que la intersección con la circunferencia depende únicamente del ángulo de la semi-recta, por lo que podemos suponer spdg que $\theta \in (0, \pi)$, pues los demás ángulos serán análogos. Igualmente, como $\theta \in (0, \pi)$ solo tendremos la intersección con la parte superior de la circunferencia, así que spdg podemos considerarla.



Con todo esto sean la circunferencia y la semi-recta: $D_r = \{re^{i\alpha} : \alpha \in (0, \pi)\}$, $r > 0$ y $L_\theta = \{te^{i\theta} : \theta \neq y_0, t \geq 0\}$, $\theta \in (0, \pi)$. Y entonces las dos curvas se intersecan en un ángulo ortogonal.

Analicemos sus imágenes bajo el logaritmo.

- Sea $z \in D_r$, entonces $\log(z) = \ln r + i(\alpha + 2k\pi)$ con $k \in \mathbb{Z}$ tal que $\alpha + 2k\pi \in (y_0, y_0 + 2\pi)$, con lo que al variar α obtenemos una recta vertical que pasa por $\ln(r)$.



- Sea $z \in L_\theta$, entonces $\log(z) = \ln t + i(\theta + 2k\pi)$ con $k \in \mathbb{Z}$ tal que $\theta + 2k\pi \in (y_0, y_0 + 2\pi)$, con lo que al variar r obtenemos una recta horizontal que pasa por $i(\theta + 2k\pi)$.



Con lo que efectivamente, obtenemos que las dos nuevas curvas forman un ángulo ortogonal entre sí. ■

Problema 7. – *Describa a las imágenes de rectas verticales y segmentos horizontales de la función $z \rightarrow \cos(z)$ en la franja vertical $V = \{z \in \mathbb{C} : 0 < \operatorname{Re}(z) < \pi\}$. Diga en qué dirección se recorren estas imágenes si las rectas verticales las muevo de izquierda a derecha y los segmentos horizontales se mueven de arriba a hacia abajo. Demuestre que $z \rightarrow \cos(z)$ es conforme en dicha franja e interprete geométricamente la conformalidad.*

Solución:

1) Veamos las imágenes de las rectas verticales y los segmentos horizontales.

Recordemos que para $z \in \mathbb{C}$

$$\cos(z) = \cos(x + iy) = \cos(x) \cos(iy) - \sin(x) \sin(iy) = \cos(x) \cosh(y) - i \sin(x) \sinh(y)$$

• Consideremos la recta vertical $l_{x_0} = \{x_0 + iy : y \in \mathbb{R}\} \subseteq V$ con $x_0 \in (0, \pi)$ fijo. Entonces tendremos que $z \in l_{x_0} \Leftrightarrow z = x_0 + iy \Leftrightarrow$

$$\cos(z) = \cos(x_0 + iy) = \cos(x_0) \cosh(y) - i \sin(x_0) \sinh(y)$$

Con esto veamos, que sí $z \in l_{x_0}$, entonces $\cos(z)$ pertenece a la hipérbola

$$P_{x_0} = \left\{ x + iy : \frac{x^2}{\cos^2(x_0)} - \frac{y^2}{\sin^2(x_0)} = 1 \right\} \text{ si } x_0 \neq \frac{\pi}{2}$$

Y pertenece a la recta

$$P_{\pi/2} = \{iy : y \in \mathbb{R}\} \text{ si } x_0 = \frac{\pi}{2}$$

○ Si $x_0 = \frac{\pi}{2}$. En efecto, se tiene que

$$\cos(z) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \cosh(y) - i \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \sinh(y) = -i \sinh(y)$$

$$\therefore \cos(z) \in P_{\pi/2}$$

○ Si $x_0 \neq \frac{\pi}{2}$. Se tendrá que $\cos(x_0) \neq 0$ y como $x_0 \in (0, \pi) \Rightarrow \sin(x_0) \neq 0$ con lo que P_{x_0} está bien definido. Además, se tiene que:

$$\frac{[\cos(x_0)\cosh(y)]^2}{\cos^2(x_0)} - \frac{[-\sin(x_0)\sinh(y)]^2}{\sin^2(x_0)} = \cosh^2(y) - \sinh^2(y) = 1$$


$\therefore \cos(z) \in P_{x_0}$. Con esto tendremos que $\cos(l_{x_0} - \left\{ \frac{\pi}{2} \right\}) \subseteq P_{x_0}$.

Solo tenemos esta contención pues dependiendo de si x_0 sea menor o mayor a $\frac{\pi}{2}$ la imagen de la recta será la parte izquierda o derecha de la hipérbola, pues como para $x_0 \in (0, \frac{\pi}{2})$ coseno es positivo entonces $\cos(l_{x_0})$ será la parte derecha de la hipérbola y para $x_0 \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ coseno es negativo entonces $\cos(l_{x_0})$ será la parte izquierda de la hipérbola. Si consideramos $L_{x_0} = \{x_0 + iy : y \in \mathbb{R}\} \cup \{\pi - x_0 + iy : y \in \mathbb{R}\}$ con $x_0 \in (0, \frac{\pi}{2})$ se tendrá que $\cos(L_{x_0}) = P_{x_0}$.

Analizando P_{x_0} se tiene que es una hipérbola centrada en el origen donde la excentricidad vendrá dada por^β

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{\cos^2(x_0) + \sin^2(x_0)}{\cos^2(x_0)}} = \sqrt{\frac{1}{\cos^2(x_0)}} = \frac{1}{|\cos(x_0)|}$$

Con todo esto tendremos que mover las rectas verticales de izquierda a derecha se traduce en incrementar a x_0 con lo que tendremos una diminución de la excentricidad con $x_0 \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$ y un aumento en $x_0 \in (0, \frac{\pi}{2})$, que geométricamente se traduce en que hipérbola se hará mas abierta u cerrada.



^β Dada la hipérbola $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ la excentricidad es $\varepsilon = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{a^2}}$.

- Consideremos el segmento horizontal $l_{y_0} = \{x + iy_0 : x \in (0, \pi)\} \subseteq V$ con $y_0 \in \mathbb{R}$. Entonces tendremos que $z \in l_{y_0} \Leftrightarrow z = x + iy_0 \Leftrightarrow$

$$\cos(z) = \cos(x + iy_0) = \cos(x) \cosh(y_0) - i \sin(x) \sinh(y_0)$$

Con esto veamos, que sí $z \in l_{y_0}$, entonces $\cos(z)$ pertenece a la elipse

$$E_{y_0} = \left\{ x + iy : \frac{x^2}{\cosh^2(y_0)} + \frac{y^2}{\sinh^2(y_0)} = 1 \right\} \text{ si } y_0 \neq 0$$

Y pertenece al segmento

$$E_0 = \{x : x \in (-1, 1)\} \text{ si } y_0 = 0$$

- Si $y_0 = 0$. En efecto, se tiene que

$$\cos(z) = \cos(x) \cosh(0) - i \sin(x) \sinh(0) = \cos(x)$$

Y como $x \in (0, \pi) \Rightarrow \cos(x) \in (-1, 1) \therefore \cos(z) \in E_0$.

- Si $y_0 \neq 0$. Se tendrá que $\sinh(y_0) \neq 0$ y $\cosh(y_0) \neq 0$ con lo que E_{y_0} está bien definido.

Además, se tiene que:


$$\frac{[\cos(x) \cosh(y_0)]^2}{\cosh^2(y_0)} + \frac{[-\sin(x) \sinh(y_0)]^2}{\sinh^2(y_0)} = \cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$$

$\therefore \cos(z) \in E_{y_0}$. Con esto tendremos que $\cos(l_{y_0} - \{0\}) \subseteq E_{y_0}$. Solo tenemos esta contención pues dependiendo de si y_0 sea menor o mayor a 0 la imagen del segmento será la parte superior o inferior de la elipse, pues como para $y_0 > 0$ \sinh es positivo entonces $-\sin(x) \sinh(y_0)$ es negativo $\Rightarrow \cos(l_{y_0})$ será la parte inferior de la elipse y para $y_0 < 0$ \sinh es negativo entonces $-\sin(x) \sinh(y_0)$ es positivo $\Rightarrow \cos(l_{y_0})$ será la parte superior de la elipse. Si consideramos $L_{y_0} = \{x + iy_0 : x \in (0, \pi)\} \cup \{x - iy_0 : x \in (0, \pi)\}$ con $y_0 > 0$ se tendrá que $\cos(L_{y_0}) = E_{y_0}$.

Analizando E_{y_0} se tiene que es una elipse centrada en el origen, con eje mayor sobre el eje real (pues $\cosh(x_0) > \sinh(x_0)$), donde la excentricidad vendrá dada por^β

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{\cosh^2(y_0) - \sinh^2(y_0)}{\cosh^2(y_0)}} = \sqrt{\frac{1}{\cosh^2(y_0)}} = \frac{1}{\cosh(y_0)}$$

Con todo esto tendremos que mover los segmentos horizontales de arriba hacia abajo se traduce en disminuir a y_0 con lo que tendremos un aumento de la excentricidad con $y_0 > 0$ y una disminución con $y_0 < 0$, que geométricamente se traduce en que elipse se hará más abierta u cerrada.




Con todo esto podemos comprobar la conformalidad, solo veremos dos casos:

⊗ Si $x_0 = \frac{\pi}{2}$ y $y_0 = 0$ tendremos que l_{x_0} es la recta vertical que pasa por $\frac{\pi}{2}$ y l_{y_0} es el segmento horizontal entre 0 y π por lo que se cortan ortogonalmente, y efectivamente, tendremos que $\cos(l_{x_0}) = P_{\pi/2} = \{iy : y \in \mathbb{R}\}$ y $\cos(l_{y_0}) = E_0 = \{x : x \in (-1,1)\}$ que se intersecan ortogonalmente.

⊗ Si $x_0 > \frac{\pi}{2}$ y $y_0 > 0$ tendremos que l_{x_0} una recta vertical y l_{y_0} es un segmento horizontal entre 0 y π por lo que se cortan ortogonalmente, y efectivamente, tendremos que $\cos(l_{x_0})$ es la parte izquierda de la hipérbola y $\cos(l_{y_0})$ es la parte inferior de la elipse, las cuales se intersecan ortogonalmente.

Los demás casos serán similares. Comprobándose así, la conformalidad.



β Dada la hipérbola $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$ con $a > b$ la excentricidad es $\varepsilon = \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{a^2}}$.

Lema. – Sea $f : U \rightarrow \mathbb{C}$, $U \subseteq \mathbb{C}$ una región. f cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann si y solo si

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -i \frac{\partial f}{\partial y}$$

Demostración:

⇒] Supongamos que f cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces tenemos que

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial(u + iv)}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y} = -i \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) = -i \frac{\partial f}{\partial y}$$

⇐] Supongamos que $\frac{\partial f}{\partial x} = -i \frac{\partial f}{\partial y}$, entonces

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} &= \frac{\partial f}{\partial x} = -i \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y} \\ \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial v}{\partial y} \quad \text{y} \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} \end{aligned}$$

Quedando demostrado. ■

Problema 8. – Demuestre que si f es una función entera y no constante, entonces la función $z \rightarrow f(\bar{z})$ no es holomorfa en ningún punto del plano.

Demostración: Veamos que $f(\bar{z})$ no cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann.

Sea $z \in \mathbb{C}$, como f es entera y no constante se tendrá que existen $\frac{\partial f}{\partial x}(z)$ y $\frac{\partial f}{\partial y}(z)$ y serán distintas de cero^ψ. En efecto, tenemos que

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(\bar{z})}{\partial x} &= \frac{\partial f(z)}{\partial x} \cdot \frac{\partial(\bar{z})}{\partial x} = \frac{\partial f(z)}{\partial x} \cdot \frac{\partial(x - iy)}{\partial x} = \frac{\partial f(z)}{\partial x} \cdot 1 = \frac{\partial f(z)}{\partial x} \\ &\quad \text{y} \\ \frac{\partial f(\bar{z})}{\partial y} &= \frac{\partial f(z)}{\partial y} \cdot \frac{\partial(\bar{z})}{\partial y} = \frac{\partial f(z)}{\partial y} \cdot \frac{\partial(x - iy)}{\partial y} = \frac{\partial f(z)}{\partial x} \cdot (-1) = -\frac{\partial f(z)}{\partial x} \end{aligned}$$

∴ $\frac{\partial f}{\partial x} \neq -i \frac{\partial f}{\partial y}$ ∴ por el lema anterior no cumple C-R ∴ no es holomorfa en ningún punto.

^ψ Como f es holomorfa en \mathbb{C} , cumple C-R y si pasara, por ejemplo $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$, entonces por el lema anterior se tendría que $\frac{\partial f}{\partial y} = 0$ y entonces f sería una función constante, lo cual supusimos que no pasaba.

Problema 9. – Encuentre el dominio de analiticidad de las siguientes funciones, así como su derivada.

a) $z \rightarrow \sqrt[3]{e^z - 1}$, donde la raíz cubica se define mediante la rama principal del logaritmo.

b) $z \rightarrow \log(\sqrt{z} + 2i)$, donde \log denota la rama del logaritmo con argumentos en $(\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2})$.

Demostración:

a) $z \rightarrow \sqrt[3]{e^z - 1}$.

Como la raíz cubica se define mediante la rama principal del logaritmo, tendremos que será holomorfa en $\mathbb{C} \setminus B_{-\pi} = \{z \in \mathbb{C} : z \neq te^{-\pi i}, t \geq 0\} = \{z \in \mathbb{C} : z \neq -t, t \geq 0\}$. Así solo necesitamos saber para cuales $z \in \mathbb{C}$ se tiene que $e^z - 1 \in \mathbb{C} \setminus B_{-\pi}$.

Sea $z \in \mathbb{C}$ t.q $e^z - 1 \in B_{-\pi} \Rightarrow e^z - 1 \leq 0 \Rightarrow e^z \leq 1 \Rightarrow e^{x+iy} \leq 1 \Rightarrow e^x e^{iy} \leq 1$ entonces

$$e^x \cos(y) + ie^x \sin(y) \leq 1 \Leftrightarrow e^x \cos(y) \leq 1 \wedge e^x \sin(y) = 0.$$

$$\bullet e^x \sin(y) = 0 \Leftrightarrow \begin{matrix} \sin(y) = 0 \\ e^x > 0 \end{matrix} \Leftrightarrow y = \pi k \text{ con } k \in \mathbb{Z}$$

$$\bullet e^x \cos(y) \leq 1 \Leftrightarrow \begin{matrix} \cos(y) \leq e^{-x} \\ e^x > 0 \end{matrix}, \text{ y esto se cumplirá siempre que } e^{-x} \geq 1 \text{ lo que significa que}$$

$$x \leq 0.$$


Con lo anterior tenemos que $z \in \mathbb{C}$ es tal que $e^z - 1 \in B_{-\pi}$ si y solo

si $z \in \{x + i\pi k : k \in \mathbb{Z} \text{ y } x \leq 0\}$ (imagen)

De esta manera tendremos que como $e^z - 1$ es entera, en particular será holomorfa en $\mathbb{C} \setminus \{x + i\pi k : k \in \mathbb{Z} \text{ y } x \leq 0\}$ y será tal que para

todo $z \in \mathbb{C} \setminus \{x + i\pi k : k \in \mathbb{Z} \text{ y } x \leq 0\} \Rightarrow e^z - 1 \notin B_{-\pi}$ y como la raíz

cubica es holomorfa en $\mathbb{C} \setminus B_{-\pi}$ tendremos por la regla de la cadena que $\sqrt[3]{e^z - 1}$ es holomorfa en $\mathbb{C} \setminus \{x + i\pi k : k \in \mathbb{Z} \text{ y } x \leq 0\}$.



$$\begin{aligned} \text{Así tomando } z \in \mathbb{C} \setminus \{x + i\pi k : k \in \mathbb{Z} \text{ y } x \leq 0\} \text{ se tendrá por la regla de la cadena que } \frac{d}{dz} \sqrt[3]{e^z - 1} = \\ = \frac{d}{dz} (e^z - 1)^{1/3} = \frac{1}{3} (e^z - 1)^{-2/3} \cdot e^z = \frac{e^z}{3\sqrt[3]{(e^z - 1)^2}}. \end{aligned}$$


b) $z \rightarrow \log(\sqrt{z} + 2i)$.

Como la raíz cuadrada se define mediante la rama $(\frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2})$ del logaritmo, tendremos que será holomorfa en $\mathbb{C} \setminus B_{-\pi/2} = \left\{ z \in \mathbb{C} : z \neq te^{-\frac{\pi}{2}i}, t \geq 0 \right\} = \left\{ z \in \mathbb{C} : z \neq -it, t \geq 0 \right\}$. Así solo necesitamos saber cuáles $z \in \mathbb{C} \setminus B_{-\pi/2}$ se tiene que $\sqrt{z} + 2i \in \mathbb{C} \setminus B_{-\pi/2}$ y de esta manera el logaritmo sea diferenciable en estos puntos.

Sea $z \in \mathbb{C} \setminus B_{-\pi/2}$ tal que $\sqrt{z} + 2i \in B_{-\pi/2} \Rightarrow \sqrt{z} + 2i = -it$ para alguna $t \geq 0 \Rightarrow \sqrt{z} = -it - 2i = (-t-2)i \Rightarrow z = -(t+2)^2$ y como $t \leq 0 \Rightarrow -(t+2)^2 \leq -4 \therefore \sqrt{z} + 2i \in B_{-\pi/2} \Rightarrow z \leq -4 \Rightarrow x + iy \leq -4$, entonces: $y = 0$ y $x \leq -4$.

Con lo anterior tenemos que $z \in \mathbb{C} \setminus B_{-\pi/2}$ es tal que $\sqrt{z} + 2i \in B_{-\pi/2}$ sí y solo si $z \in \{x : x \leq 4\}$ (imagen)

De esta manera tendremos que como $\sqrt{z} + 2i$ es holomorfa en $\mathbb{C} \setminus B_{-\pi/2}$, en particular será holomorfa en $\mathbb{C} \setminus (B_{-\pi/2} \cup \{z : z = x, x \leq 4\})$ y será tal que para todo $z \in \mathbb{C} \setminus (B_{-\pi/2} \cup \{z : z = x, x \leq 4\}) \Rightarrow \sqrt{z} + 2i \notin B_{-\pi/2}$ y como el logaritmo es holomorfo en $\mathbb{C} \setminus B_{-\pi/2}$ tendremos por la regla de la cadena que $\log(\sqrt{z} + 2i)$ es holomorfa en $z \in \mathbb{C} \setminus (B_{-\pi/2} \cup \{z : z = x, x \leq 4\})$.



Así tomando $z \in \mathbb{C} \setminus (B_{-\pi/2} \cup \{z : z = x, x \leq 4\})$ se tendrá por la regla de la cadena que $\frac{d}{dz} \log(\sqrt{z} + 2i) = \frac{1}{\sqrt{z} + 2i} \cdot \frac{d}{dz}(\sqrt{z} + 2i) = \frac{1}{\sqrt{z} + 2i} \cdot \frac{1}{2\sqrt{z}} = \frac{1}{2z + 4\sqrt{z}}$. ■

Problema 10. – Demuestre que si una función g es holomorfa en un dominio D y su derivada n -ésima se anula en todo punto, entonces la función es un polinomio de grado menor o igual a $n-1$.

Demostración: Por inducción sobre n .

Para $n = 1$. Supongamos que g es holomorfa, tal que $g^{(1)}(z) = 0 \forall z$. Como g es holomorfa, tendremos que $g^{(1)}(z) = \frac{\partial u}{\partial x}(z) + i \frac{\partial v}{\partial x}(z) = 0 \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial x}(z) = 0 = \frac{\partial v}{\partial x}(z)$ y por C-R tendremos que entonces $\frac{\partial u}{\partial x}(z) = 0 = \frac{\partial v}{\partial y}(z)$ y $\frac{\partial u}{\partial y}(z) = 0 = \frac{\partial v}{\partial x}(z)$ por lo que u, v son constantes, y entonces $g(z) = a + ib$ que es un polinomio de grado 0.

Ahora supongamos que para $k > 1$ se cumple, es decir, si g es holomorfa en D y tal que $g^{(k)} = 0 \Rightarrow g$ es un polinomio de grado menor o igual a $k-1$.

Entonces sea g holomorfa en D tal que $g^{(k+1)} = 0$.

PD g es un polinomio de grado menor o igual a k .

obs. Como existe $g^{(k+1)} \Rightarrow g^{(r)}$ existe para toda $r \leq k$ en particular existe g' y será holomorfa en D .

Por hipótesis sabemos qué $g^{(k+1)} = 0 \Rightarrow (g')^{(k)} = 0$ y como g' es holomorfa en D (por la obs) tendremos una función que se anula en su n -ésima derivada, de esta manera por la hipótesis de inducción $g'(z) = a_r z^r + \dots + a_1 z + a_0$ con $r \leq k-1$, de esta manera se tendrá que $g(z) = a_r z^{r+1} + \dots + a_1 z^2 + a_0 z + C$, que es un polinomio de grado menor o igual a k , que es lo que queríamos probar.

∴ por inducción sobre n queda demostrado. ■

Anexos

1) Definicion **circunferencia/recta** en \mathbb{C}

Tenemos que la ecuación general de la recta/circunferencia en \mathbb{R}^2 es

$$A(x^2 + y^2) + Bx + Cy + D = 0, \quad A, B, C, D \in \mathbb{R}$$

siendo una recta si y solo sí $A = 0$. Recordando las conversiones $x = \frac{z+\bar{z}}{2} = \frac{1}{2}z + \frac{1}{2}\bar{z}$ y $y = \frac{z-\bar{z}}{2i} = -i\frac{1}{2}z + i\frac{1}{2}\bar{z}$, podemos obtener la forma compleja de la ecuación:

$$\begin{aligned} A(x^2 + y^2) + Bx + Cy + D = 0 &\Leftrightarrow Az\bar{z} + B\left(\frac{1}{2}z + \frac{1}{2}\bar{z}\right) + C\left(-i\frac{1}{2}z + i\frac{1}{2}\bar{z}\right) + D = 0 \\ &\Leftrightarrow Az\bar{z} + \frac{1}{2}Bz + \frac{1}{2}B\bar{z} - i\frac{1}{2}Cz + i\frac{1}{2}C\bar{z} + D = 0 \Leftrightarrow Az\bar{z} + \left[\frac{1}{2}Bz - i\frac{1}{2}Cz\right] + \left[\frac{1}{2}B\bar{z} + i\frac{1}{2}C\bar{z}\right] + D = 0 \\ &\Leftrightarrow Az\bar{z} + \left[\frac{1}{2}B - i\frac{1}{2}C\right]z + \left[\frac{1}{2}B + i\frac{1}{2}C\right]\bar{z} + D = 0 \Leftrightarrow Az\bar{z} + \bar{E}z + E\bar{z} + D = 0 \text{ con } E = \frac{1}{2}B + i\frac{1}{2}C \end{aligned}$$

∴ la formula general de la recta/circunferencia es $C : Az\bar{z} + \bar{E}z + E\bar{z} + D = 0$ con $A, D \in \mathbb{R}$ y $E \in \mathbb{C}$, siendo recta si y solo sí $A = 0$.

2) Si $0 \notin C$. (con lo que $D \neq 0$) si $z \in C$ entonces $\frac{1}{z}$ está en: $\tilde{C} : Dw\bar{w} + Ew + \bar{E}\bar{w} + A = 0$

Yo quiero encontrar una recta/circunferencia tal que $A\frac{1}{z}\frac{1}{\bar{z}} + \bar{E}\frac{1}{z} + E\frac{1}{\bar{z}} + \Delta = 0$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{z}\frac{1}{\bar{z}}[A + \bar{E}\bar{z} + Ez + \Delta z\bar{z}] = 0$$

entonces si tomo $A = D$, $E = \bar{E}$ y $\Delta = A$ obtengo que $\frac{1}{z}\frac{1}{\bar{z}}[D + E\bar{z} + \bar{E}z + Az\bar{z}] = 0$. Y esta es la buscada.

3) Si $z \in C : Az\bar{z} + \bar{E}z + E\bar{z} = 0$ entonces $\frac{1}{z}, z \neq 0$ está en $\tilde{C} : Ew + \bar{E}\bar{w} + A = 0$

Yo quiero encontrar una recta/circunferencia tal que $A\frac{1}{z}\frac{1}{\bar{z}} + \bar{E}\frac{1}{z} + E\frac{1}{\bar{z}} = 0$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{z}\frac{1}{\bar{z}}[A + \bar{E}\bar{z} + Ez + \Delta] = 0$$

entonces si tomo $A = 0$, $E = \bar{E}$ y $\Delta = A$ obtengo que $\frac{1}{z} \frac{1}{\bar{z}} [E\bar{z} + \bar{E}z + A\bar{z}\bar{z}] = 0$. Y esta es la buscada.

4) Supongamos $w \neq 0$ y sea $C : Az\bar{z} + \bar{E}z + E\bar{z} + D = 0$ una recta/circunferencia, entonces si $z \in C$ tendremos que $w \cdot z$ pertenece a la recta/circunferencia $\tilde{C} : \frac{A}{|w|^2} z\bar{z} + \frac{\bar{E}}{w} z + \frac{E}{\bar{w}} \bar{z} + D = 0$.

Yo quiero encontrar una recta/circunferencia tal que $A(w \cdot z)\overline{(w \cdot z)} + \bar{E}(w \cdot z) + E\overline{(w \cdot z)} + \Delta = 0$

$$\Leftrightarrow A|w|^2 z\bar{z} + \bar{E}w \cdot z + E\bar{w} \cdot \bar{z} + \Delta = 0 \Leftrightarrow A|w|^2 z\bar{z} + \bar{E}w \cdot z + E\bar{w} \cdot \bar{z} + \Delta = 0$$

entonces si tomo $A = \frac{A}{|w|^2}$, $E = \frac{E}{\bar{w}}$ y $\Delta = D$ obtengo que $Az\bar{z} + \bar{E}z + E\bar{z} + D = 0$. Y esta es la buscada.