



Universidad Nacional Autónoma de México  
Facultad de Ciencias



VARIABLE COMPLEJA III

TAREA 1

Por: Lorenzo Antonio Alvarado Cabrera

**Problema 1.** –

**vale(2.0)** Determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

- a) Existe una función analítica e invertible  $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{D}$ , con  $f(\mathbb{C}) = \mathbb{D}$ . Es decir, es posible deformar a  $\mathbb{C}$  en el disco  $\mathbb{D}$  con una homeomorfismo que preserva ángulos (con orientación).
- b) Sea  $\Omega \subseteq \mathbb{C}$  conjunto simplemente conexo y  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  analítica e invertible entonces  $f(\Omega)$  es simplemente conexo en  $\mathbb{C}$ .
- c) Sea  $\Omega \subsetneq \mathbb{C}$  región simplemente conexa y  $z_0 \in \Omega$ . La familia de funciones analíticas e invertibles de  $\Omega$  en  $\mathbb{D}$  que se anulan en  $z_0$  es no vacía.
- d) Sea  $\Omega$  región. Si  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  función analítica e invertible entonces  $f^{-1}$  es analítica.

Demostración:

(a) Falso.

Si  $f : \mathbb{C} \rightarrow D$  es analítica e invertible tal que  $f(\mathbb{C}) = D$  entonces tendremos que  $f$  es entera y acotada, pues  $\forall z \in \mathbb{C}$ ,  $|f(z)| \leq 1$  por lo que, por el Teorema de Liouville,  $f$  es constante, es decir,  $f(z) = c$  para algún  $c \in \mathbb{C}$  pero entonces  $f(\mathbb{C}) = \{c\} \neq D$  por lo que no puede existir dicha función. ■

(b) Verdadero.

Sea  $\gamma : [a, b] \rightarrow f(\Omega)$  y veremos que será homotópica a un punto en  $f(\Omega)$ . En efecto, consideremos  $f^{-1} \circ \gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$  la cual está bien definida pues  $f$  es invertible, entonces, como  $\Omega$  es simplemente conexa tendremos que  $f^{-1} \circ \gamma$  es homotópica a un punto digamos  $z_0 \in \Omega$ , es decir, existe  $H : [a, b] \times [0, 1] \rightarrow \Omega$  continua tal que  $H(t, 0) = (f^{-1} \circ \gamma)(t)$  y  $H(t, 1) = z_0 \quad \forall t \in [a, b]$ . Con ello consideremos  $f \circ H : [a, b] \times [0, 1] \rightarrow f(\Omega)$  y veamos que esta es la homotopía buscada.

En efecto, como  $f$  es analítica, será continua y por tanto  $f \circ H$  es continua y además  $(f \circ H)(t, 0) = (f \circ f^{-1} \circ \gamma)(t) = \gamma(t)$  y  $(f \circ H)(t, 1) = f(z_0) \quad \forall t \in [a, b]$ , por tanto  $\gamma$  es homotópica a  $f(z_0)$ . Y como la curva fue arbitraria obtenemos que  $f(\Omega)$  es simplemente conexa. ■

(c) Verdadero.

Como  $\Omega$  es una región simplemente conexa tendremos por el Teorema 4 del 24 de agosto que existe  $f : \Omega \rightarrow f(\Omega) \subseteq D$  biholomorfismo (analítica e invertible). Ahora sea  $g(z) = \frac{1}{2}[f(z) - f(z_0)]$  y veamos que esta es la función buscada. En efecto de forma inmediata, como  $f$  es biholomorfismo

tendremos que  $g$  lo será, y además  $|g(z)| = \left| \frac{1}{2}[f(z) - f(z_0)] \right| = \frac{1}{2} |f(z) - f(z_0)|^{\textcolor{teal}{\delta}} < \frac{1}{2}[2] < 1$  por lo que  $g : \Omega \rightarrow g(\Omega) \subseteq D$ , analítica, invertible y tal que  $g(z_0) = 0$ , por tanto la familia es no vacía. ■

(d) Falso.

Esto es claro tomando  $f(z) = z^n$  es analítica e invertible en  $\mathbb{C}$  pero su inversa (la raíz) no es analítica en  $\mathbb{C}$ . ■

**Problema 2.** –

**vale(2.0)** Sea  $\Omega \subsetneq \mathbb{C}$  región simplemente conexa. Si existe un biholomorfismo  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{D}$  entonces este es único.

Demostración: Supongamos que existe un biholomorfismo  $f : \Omega \rightarrow D$ .

Entonces por el inciso (c) del problema 1 sabemos que  $g : \Omega \rightarrow D$  dada por  $g(z) = \frac{1}{2}[f(z) - f(0)]$  será un biholomorfismo tal que  $g(0) = 0$  y por ser biholomorfismo, debe de existir  $z_0 \in \Omega$  tal que  $g'(z_0) \neq 0$  por lo que usando el teorema 5 del 19 de agosto, tendremos que  $g$  es única y por tanto  $f$  es única. ■

**Problema 3.** –

**vale(2.0)** Sea  $\Omega$  una región y  $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  función. Demuestre que  $f$  es analítica con  $f'(z) \neq 0$  si y solo si  $f$  (como función de  $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ) es conforme (preserva ángulos con orientación).

Demostración: Supongamos que  $f$  es analítica y  $f'(z_0) \neq 0$  entonces podemos pensar a  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  con  $f(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$  y entonces

$$J_f = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} \stackrel{C.R.}{=} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & -\frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial x} \end{pmatrix} \Leftrightarrow DJ_f = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & -\frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial x} \end{vmatrix} = \left( \frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left( \frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 = |f'(z)|$$

por lo que al tener como radio a  $|f'(z)|$  y el ángulo respectivo  $\theta = \cos^{-1}\left(\frac{\partial u / \partial x}{|f'(z_0)|}\right)$  (pues  $f'(z_0) \neq 0$ ) tendremos que

$$J_f = r \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

que por lo visto en clase me dice que  $f$  es conforme. ■

---

<sup>\textcolor{teal}{\delta}</sup> Esto es pues  $\forall z \in \Omega \quad f(z) \in D \quad y \quad f(z_0) \in D$  por lo que a lo mas la distancia entre ambos complejos es 2.

**Problema 4. –**

**vale(2.0)** Sea  $\Omega \in \mathbb{C}$  región y  $f_n : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$  sucesión de funciones analíticas que convergen normalmente a  $f$ . Demuestre que  $f$  es analítica en  $\Omega$ . (Hint: Teorema de Morera y Cauchy)

Demostración: Sea  $\gamma \subset \Omega$  curva cerrada simple, entonces existe un compacto  $K \subset \Omega$  tal que  $\gamma \subseteq K$ , pues de no ser así tendríamos que  $\gamma \cap \partial\Omega \neq \emptyset$  y querría decir que  $\gamma \not\subseteq \Omega$  lo cual no pasa, con ello

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z) dz$$

y como  $f_n \rightarrow f$  normalmente, entonces converge uniformemente en  $\gamma \subseteq K$  por lo que

$$\int_{\gamma} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z) dz = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\gamma} f_n(z) dz$$

y como  $f_n$  son analíticas en  $\gamma$ , tendremos por el teorema de cauchy que  $\int_{\gamma} f_n(z) dz = 0 \ \forall n \in \mathbb{N}$ , es decir

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\gamma} f_n(z) dz = \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$$

por lo que al ser  $\gamma$  arbitraria el teorema de Morera me asegura que  $f$  es analítica en  $\Omega$ .

■

**Problema 5. –**

**vale(2.0)** Considere el potencial complejo  $w = z + 2iz^2$ . Calcular la rapidez  $|V|$  en los puntos  $z = 0, 1, i$  para el flujo en el semiplano superior asociado al potencial complejo dado. Determina si hay puntos estacionarios. Encuentre las ecuaciones de las líneas de corriente y las líneas equipotenciales.

Demostración:



